

抄
録

産褥熱ニ於ケル轉移性眼炎ニ

就テ

統計ニ由ルニ轉移性眼炎ノオコル産婦ノ年齢ハ三十三歳位ヲ平均トシ、二十五歳以下ハ少シ、マタ二、三回目ノ經産婦ノ産後ニ多シ、一眼發病四〇ニ對シ兩眼二七ノ比例ナリ、左右ヲ侵ス間隔ハ通常二、三日ナルモ罕レニ六日、十二日、二十四日ヲ經過シテ發病セル例アリ。

本病ノ發來ハ産婦ノ生命ノ危篤ヲ意味スルモノト云フモ可ナリ、即チ一眼性ニ於テスラ約六〇%ノ死亡數アリ、兩眼性ニアリテハ二十七例中存命セシモノ漸ク四例ニ過ギズ。通常第二眼發病後約六日目頃ニ死亡スルモノ多シ。

河本博士ノ實驗セルモノハ初診時既ニ本病ヲ經過シ、幸ニ生命ヲ保チ眼球癆ニ陥レルモノニシテ年齢二十六歳、第二回ノ産褥中ニオコリシモノニシテ分娩後三日目ヨリ

發熱アリ、ソノ後十五日ヲ經テ眼症ヲ初發シ、初メ視力障碍ヲ覺エ、遂ニ全眼球炎ヲ形成シ、破潰セシモノナリ。

(河本重次郎、中央眼科醫報第九卷十號大正六年十月)

つ、た生抄