31.

612.375.5

Fuchsin-S = 依ル肝臟機能検査法 = 就テ

(第 1 報)

岡山醫科大學稻田内科教室(主任稻田教授)

助手 醫學士 植 田 安 昌

[昭和 17 年 12 月 10 日受稿]

第 1 章 緒 論

生體ニ於ケル中間代謝物質ニ對スル肝臟ノ役割ハ先進諸家ニヨツテ既ニ闡明セラレ又肝臟機能障礙ハ種々ノ中間代謝物質ヲ以テスル負荷試験ニヨツテ之ヲ證明シ得ルコトモ周知ノ事實デアリ。

信肝臟機能障礙時ニ於ケル色素排泄作用ノ研究所謂 Chromodiagnostik ハ 1912 年 Koch ニヨリ「メチレン青」排泄作用ノ研究ニ始リ、以來此目的ニ對シ種々ノ色素ガ使用セラルルニ至ツタ。例ヘバ Rosenthal(1922)ハ「ナトラクロールフェノールフタレイン」ヲ Lehpin(1921)ハ「インデゴカルミン」ヲ Feustermann 倉矢氏ハ「アゾルビン」(酸性)ヲ又 Beuhold ハ「コンゴローート」ヲ使用シ尙ホ「サントニ製劑」タル「ドラスミン」ヲ用フルモノモアル。

何レニシテモ色素ヲ以テスル肝臟機能検査法ハ使用スル色素ノ膽汁ヘ移行スル狀況或ハ血中ニ於ケル量ノ變化乃至尿中ヘノ排泄量等ヨリシテ之ヲ判定スベキデアリ。

1927 年 Borak ハ Fuchsin-S ノ尿中排泄試験ガ肝臟機能検査法トシテ用ヒラルベキコトヲ立證シ次テ 1940 年 Bila Zemlén 氏ハ其ノ追試發表ヲ行ツタ。即チ氏ハ 5% ノ Fuchsin-S 20 cc ヲ空腹時患者ヘ經口ニ與ヘ、後 $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3, 6, 9, 12, 24 時間後ニ於ケル採取尿ニ就テ色素排泄ノ濃度ヲ時間的ニ追及シタ結果、實質性肝臟障礙時ニ於テハ尿中ヘノ色素排泄ヲ來サナイコトヲ

觀タ、例ヘバ加答兒性黃疸、「サルベルサン黃疸」及ビ肝硬變症等デハ全ク色素ノ排泄ヲ來サザルカ或ハ其ノ抑制ヲ被ルニ反シ、總輸膽管閉塞性黃疸即チ膽石症脾臟癌膽囊癌及ビ淋巴肉芽腫等デハ色素排泄ニ異常ヲ認メナイト發表シテ居ル。

余ハ Fuchsin-S 負荷試験ノ確實性ヲ検討セント欲シ家兎ニ就テ總輸膽管結紮及ビ四鹽化炭素經口ノ投與ニヨル肝臟機能障礙ヲ惹起セシメタモノ竝ニ墨汁ヲ以テスル網内被細胞系閉塞ノ場合ニ於ケル F-S 尿中排泄ノ狀態ヲ夫々追及シ本法ノ用フベキヤ否ヤヲ検討セリ。尙ホ同時ニ余ハ「アドレナリン」負荷ニヨル肝臟機能検査法ヲモ併用シ、F-S 負荷試験ト比較ヲモ行ツタ。由テ茲ニ其ノ成績ヲ發表セント欲ス。

第 2 章 實驗方法

實驗動物トシテハ體重 2 乃至 3 kg ノ健康ナル雄性家兎ヲ用キ實驗前ノ 1 週間ハ毎日豆腐糲 250g ヲ以テ之ヲ飼養シ、一定ノ食餌ニ慣レシメタ尙ホ實驗ニ際シテハ 15 時間以上絶食セル家兎ヲ使用シ、Fuchsin-S 負荷トシテハ 1% Mer K 製 Fuchsin-S 溶液ヲ經口ノ投與ノ場合ハ「胃ゾンデ」ニヨリ經皮ノ投與ノ際ハ家兎背面ノ皮下ヘ注射シタ。又採尿ニ當ツテハ「カテーテル」ヲ用ヒ、耳靜脈カラノ採血ハ可及の家兎ノ禁擗ヲ避ケ、採血時以外ハ自由ニ之ヲ放置シタ。又血糖測定法トシテハハーゲドルン・エンセン氏法ヲ使用シタ。

尚ホ網内被糸閉塞ニ際シテハ支那墨ヲ硝子板上ニ於テ生理的食鹽水ヲ滴下シツツ磨リ、後之ヲ濾過シ滅菌セルモノヲ最初ハ7cc次ニ10cc宛ノ割合ヲ以テ毎日靜脈内注射ヲ行ツタ。

實驗ノ詳細ナル點ニ關シテハ夫々ノ項下之ヲ述ベルコトトスル。

第3章 實驗成績

第1節 對照實驗

正常家兔ヘ「胃ゾンデ」ヲ以テ1% Fuchrin-S 10cc乃至5ccヲ送入シ更ニ生水70ccヲ追加シ

F-S 送入後 20分, 40分, 1時間 10分, 2時間 10分, 3時間 10分, 6時間 10分及ビ 24時間ニ於テ夫々採尿ヲ行ヒ各々ノ尿ヘ少量ノ醋酸ヲ加ヘ、尿中 F-S 排泄ノ狀況ヲ追及シタ。而シテ色素排泄ノ濃度ハ記號, 一, 土, 十, 廿, 卅, 卅, 卅, 卅ヲ以テ示スコトトスル。

1) 1% Fuchsin-S 5cc 注入ノ場合

1% Fuchsin-S 5ccヲ胃内ヘ送入シ後生水70ccヲ追加シタル際ニ於ケル F-S 尿中排泄ハ極メテ少ク注入後 2時間ヲ經ルモ尚ホ色素排泄ハ明瞭(土)ナラズ(第1表參照)。

第 1 表

1% F.S. 5cc per. Os.

家兔番號		前	20分	40分	1時10分	1時40分	2時10分	3時10分	6時10分	24時
1	1% F-S 5cc	(一)	(一)	(一)	(土)	(土)	(土)	(土)	(土)	(一)

2) 1% Fuchsin-S 10cc 注入ノ場合

前同様ノ操作ニヨリ 1% F-S 10cc 胃内ニ送入後規定ノ採尿ヲ行ヒ、尿中色素排泄ノ狀態ヲ觀ルニ、F-S 注入後 20分乃至 40分後ニ初メテ色素ノ出現ヲ見、次デ時間ノ經過ト共ニ漸次其ノ色調ヲ強メ、略ボ 2時間乃至 3時間ヲ經テ其ノ最高度(卅)ニ達シ、以後次第ニ色調ヲ減ジ、24時間後ニ於テハ殆ド色素ノ排泄ヲ認メザルニ至ル(第2表參照)。

第 2 表

1% F.S. 10cc. per. Os.

家兔番號	前	20分	40分	1時10分	1時40分	2時10分	3時10分	6時10分	24時
2	(一)	(一)	(土)	(十)	(廿)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)
3	(一)	(一)	(十)	(廿)	(廿)	(卅)	(卅)	(卅)	(土)
4	(一)	(土)	(廿)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)

第2節 總輸膽管結紮ノ前後ニ於ケル

Fuchsin-Sノ排泄量ニ「アドレナリン注射試驗」ニ就テ

1% Fuchsin-S 10ccヲ生水70ccト共ニ經口的

投與後上記ノ間隔ヲ以テ採取シタル尿ニ就テ色素排泄ノ狀態ヲ見、又同一家兔ニ就テ 0.1%「アドレナリン」0.2ccヲ注射シ、最初ノ 30分間ハ 10分オキニ、其ノ後ハ 15分オキニ血糖ヲ測定シ、以テ對照トセリ。次デ同家兔ノ總輸膽管ヲ十二指腸開口部ニ近ク 2重結紮ヲ行ヒ、手術後 2日目, 5日目, 8日目, 11日目ニ於テ夫々 1% F-S 10ccヲ經口的ニ與ヘ、尿中色素ノ排泄狀態ヲ比較セリ。其ノ結果ハ次ノ如シ。即チ總輸膽管結紮前ニ於ケル F-Sノ尿中出現ハ 20分ニシテ濃度(土)ヲ示シ、約 3乃至 6時間ヲ以テ其ノ最高點(卅)ニ達ス、又總輸膽管結紮後 2日目ノモノニ於テハ F-S 投與後 40分ニシテ初メテ尿中少量ノ色素排泄(土)ヲ示シ、約 3乃至 6時間後ニ於テ排泄ノ最高(卅)ニ達シ、略ボ對照ト同様ノ成績ヲ得タ。然ルニ總輸膽管結紮後 5日目及ビ 8日目ニ於テハ F-S 投與後 40分ニシテ初メテ尿中色素排泄ヲ見、次デ 1時間乃至 3時間後ニ於テ最高點(卅)ニ達シ、以後次第ニ尿中色素ノ濃度ヲ減少セリ。即チ結紮後ハ結紮前ニ比シ尿中ニ於ケル F-Sニ其ノ排泄總量

ヲ來スコトヲ認メテ、尙ホ結紮後第11日目ニ行ヘル實驗成績モ略ボ5日目及ビ8日目ニ就テ行ヘルモノト同様ノ成績ヲ得テ(第3表参照)。

第3表 總輸膽管結紮

家 兎 號		前	2日目	5日目	8日目	11日目
1% F.S. 5.10 cc (經口的)	前	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	20分	(±)	(-)	(-)	(-)	(-)
	40分	(+)	(±)	(+)	(+)	(+)
	1時10分	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
	1時40分	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
	2時10分	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
	3時10分	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
	6時10分	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
	24時	(±)	(+)	(-)	(-)	(-)

次ニ同一家兎(家兎5號)ニ就テ0.1%「アドレナリン」0.2 ccヲ皮下注射シ血糖曲線ノ變化ヲ總輸膽管結紮ノ前後ニ就テ検査シテ見ルト結紮前空腹時血糖値 99 mg%ヲ示シ「アドレナリン」注射後ハ急激ニ血糖ノ上昇ヲ來シ1時間15分後ニハ其ノ最高値 314 mg%ヲ示シ其ノ後次第ニ下降シ略ボ4時間ヲ以テ空腹時血糖値ニ歸ル。

次ニ總輸膽管結紮後第3日目ノモノニ就テ同様ノ方法ノ下ニ血糖値ヲ見ルト空腹時血糖値ハ 98 mg%デアリ「アドレナリン」注射後ハ徐々ニ血糖ノ上昇ヲ來シ2時間15分後ニシテ其ノ最高値 224 mg%ニ達シ、以後次第ニ下降シ4時間

後ハ略ボ空腹時血糖値ニ歸ル。尙ホ結紮後6日目ノモノニ於テハ空腹時血糖値ハ 120 mg%デアリ「アドレナリン」注射後ハ徐々ニ血糖ノ上昇ヲ來スコト共ニ2時間30分ニシテ、其ノ最高値 192 mg%ヲ示シ、3時間30分後ニ於テ空腹時血糖値迄下降ス(第4表参照)。

第4表 總輸膽管結紮時血糖曲線 家兎第5號

更ニ6號家兎ニ就テ總輸膽管結紮前ト結紮後ノ第2日目ニ於ケル尿中 F-S 排泄ノ状態ヲ比較セルニ大體上肥實驗成績ト同一デアツテ結紮ノ前後ニ於ケル F-S 尿中排泄ニハ大ナル變化ヲ認メ難イ。但シ結紮後ニ於テハ結紮前ノモノニ比シ尿中へ色素出現ガ多少共其ノ遲延ヲ來ス様デアリ(第5表参照)。

第5表 總輸膽管結紮

1% F.S. 10 cc. per. Os.

家 兎 號		前	20分	40分	1時10分	1時40分	2時10分	3時10分	6時10分	24時
6	結 紮 前	(-)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
	結 紮 後	(-)	(-)	(±)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)

次ニ同一家兎(家兎第6號)ニ就テ總輸膽管結紮前ト總輸膽管結紮後ノ3日目ニ於ケル「アドレナリン」過血糖曲線ノ變化ヲ比較スルト次ノ様デアリ。即チ總輸膽管結紮前「アドレナリン」ヲ注射スルト注射後1時間ニシテ血糖ハ其ノ最高値

184 mg%ヲ示シ、3時間30分後ニハ空腹時血糖値迄下降ス。然ルニ總輸膽管結紮後「アドレナリン」注射後徐々ニ血糖ノ上昇ヲ來シ2時間30分後ニシテ其ノ最高値 188 mg%ニ達シ次第ニ其ノ下降ヲ來ス(第6表参照)。

第6表 總輸膽管結紮後2日目血糖曲線
家兎第8號

7號家兎ニ就テ更ニ總輸膽管結紮前ト結紮後第3日目に於ケル尿中 F-S 排泄ノ状態ヲ比較セルニ

第7表 總輸膽管結紮
1% F.S. 10 cc. per. Os.

家兎 番 號		前	20分	40分	1時10分	1時40分	2時10分	3時10分	6時10分	24時
7	結 紮 前	(-)	(-)	(±)	(+)	(+)	(++)	(++)	(++)	(±)
	結 紮 後	(-)	(-)	(-)	(-)	(±)	(±)	(±)	(±)	(-)

總輸膽管結紮後其ノ經過日數尙ホ2—3日間ニ過ギザル場合ハ尿中 F-S ノ排泄ハ正常時ハ著シク異ラナイガ經過日數5日乃至11日間ニ及ブ際ハ尿中 F-S 出現ノ時間ハ勿論負荷後3—5時間ニ於テ認メラルベキ F-S 濃度ニモ亦明白ナ減少ガ認メラレル。即チ鬱滯性黄疸ノ進行ニ連レテ尿中 F-S ノ排泄ハ漸次其ノ障礙ヲ被ルニ至ル。

總輸膽管結紮後ニ於ケル「アドレナリン」過血糖状態ノ發生ハ結紮前ノモノト比較スルト著シク過血糖程度ノ減弱ヲ來シ且其ノ低下ハ結紮後ニ於ケル經過日數ニ應ジテ甚シクナル尙ホ總輸膽管結紮後ニ於テ認メラル過血糖程度ノ低下ト尿中 F-S 排泄ノ障礙トハ略ホ相一致スル成績ヲ示ス。

第3節 四鹽化炭素投與ノ前後ニ於ケル

F-S 尿中排泄量ニ「アドレナリン」過血糖曲線ニ就テ

前實驗ト全く同様此場合モ亦四鹽化炭素投與ノ前後ニ於ケル尿中 F-S ノ排泄ト「アドレナリン」過血糖曲線ノ推移トヲ比較觀察シタ。尙ホ四鹽化

炭素ノ如シ。即チ總輸膽管結紮前ニ於ケル F-S ノ尿中出現ハ40分ニシテ其ノ濃度(±)ヲ示シ、約2時間ヲ以テ其ノ最高點(++)ニ達ス。又總輸膽管結紮後3日目ノモノニ於テハ F-S 投與後1時間40分ニシテ初メテ少量ノ色素排泄(±)ヲ示シ、其ノ後色素ノ濃度ヲ増サズ(第7表參照)。又同一家兎(家兎第7號)ニ就テ血中ニ於ケル「ビリルビン」量ノ增加ノ程度ヲ測定セルニ總輸膽管結紮後ノ第2日目に於テ81單位(アウテンリート比色計ニヨル)ヲ示シ第3日目に於テハ95單位ヲ示セリ。

炭素ハ家兎體重 1 kg = 對シ 0.5 cc ノ割合ヲ以テ經口ノ投與ヲ爲シ、後第3日目及ビ5日目に於テ F-S ノ尿中排泄ヲ觀察シタ。

四鹽化炭素投與前ノ成績ハ1% F-S 10 cc 投與後既ニ20分ニシテ色素ノ出現ヲ見、1時間乃至3時間後ニ於テ其ノ最高點(+++)ニ達ス。次ニ同一家兎ニ就テ四鹽化炭素投與後第3日目に於ケル試驗ヲ見ルト、F-S ハ其ノ投與後40分ヲ經テ漸次尿中ヘ少量ノ F-S 排泄(±)ヲ來シ、且投與後2時間ヲ經ルモ尙ホ尿中 F-S ノ排泄ハ極メテ少ク(+)6時間ニ於テ初メテ相當濃度ノ F-S 排泄(+++)ヲ見ルニ至ル。併シ四鹽化炭素投與前ニ於ケル對照時ト比較スレバ色素排泄ノ量ハ一般ニ少イ(第8表參照)。

尙ホ同一家兎(家兎第8號)ニ就テ四鹽化炭素投與前「アドレナリン」0.2 cc ノ皮下ヘ注射シ、血糖曲線ノ變化ヲ見ルニ、空腹時血糖値ハ84 mg % デアルガ注射後血糖曲線ハ急激ニ其ノ上昇ヲ來シ1時間15分後ニハ其ノ最高値315 mg % ニ達シ

次テ徐々ニ其ノ下降ヲ來ス。

第8表 四鹽化炭素投與

家番	兎號		前	3日目	5日目
8	1% F-S 10 cc 經口投與	前	(-)	(-)	(-)
		20分	(+)	(-)	(+)
		40分	(+)	(±)	(+)
		1時10分	(+)	(+)	(+)
		1時40分	(+)	(+)	(+)
		2時10分	(+)	(+)	(+)
		3時10分	(+)	(+)	(+)
		6時10分	(+)	(+)	(+)
	24時	(+)	(±)	(±)	

又同一家兎(家兎第8號) = 就テ四鹽化炭素投與後第4日目 = 同量「アドレナリン」ヲ注射シ、血糖ノ變化ヲ見ルト空腹時血糖値 91 mg% ナリシモノ「アドレナリン」注射後ハ次第ニ血糖ノ上昇ヲ來シ1時間15分後ニシテ其ノ最高値 184 mg% = 達シ3時間30分後ニ於テ空腹時血糖値迄下降シタ(第9表参照)。

第9表 四鹽化炭素投與時ノ血糖曲線
家兎第8號

尙ホ他ノ家兎(家兎第9號) = 就テ其ノ對照時並ニ四鹽化炭素 (pro kg 0.5 cc) 投與後ノ第3日目及第5日目ニ於テ上記實驗ト同様ノ方法ニヨリ尿中 F-S 排泄ノ狀態並ニ「アドレナリン」過血糖發生ノ狀況トヲ追及シタ其ノ結果ハ四鹽化炭素投與前ニ於テハ F-S 投與後 20分ニシテ既ニ尿中へ

色素ノ出現ヲ來シ次デ 3乃至6時間後ニ於テ其ノ最高點(卅)ニ達スルコト略ボ前實驗ニ於ケルモノト同様ナリ。然ルニ四鹽化炭素投與後3日目は於テハ F-S 投與後2時間ヲ經テ初メテ尿中色素ノ排泄ヲ認メラレ且投與後6時間ヲ經ルモ尙ホ尿中 F-S ノ濃度ハ(卅)對照ヨリモ著シク淡イ、更ニ四鹽化炭素投與後第5日目は於ケルモノニ於テモ亦略ボ同様ノ實驗成績ヲ得タ(第10表参照)。

第10表 四鹽化炭素投與

家番	兎號		前	3日目	5日目
9	1% F-S 10 cc 經口投與	前	(-)	(-)	(-)
		20分	(±)	(-)	(-)
		40分	(+)	(-)	(±)
		1時10分	(+)	(-)	(±)
		1時40分	(+)	(-)	(+)
		2時10分	(+)	(±)	(+)
		3時10分	(+)	(+)	(+)
		6時10分	(+)	(+)	(+)
	24時	(+)	(+)	(+)	

次ニ同一家兎(家兎第9號) = 就テ四鹽化炭素投與前ト四鹽化炭素投與後ノ第4日目ニ於ケル「アドレナリン」過血糖曲線ノ變化ヲ比較スルト次ノ様デアル。即チ四鹽化炭素投與前「アドレナリン」ヲ注射スルト注射後1時間ニシテ血糖ハ其ノ最高値 258 mg% ヲ示シ、3時間30分後ニハ空腹時血糖値迄下降ス、然ルニ四鹽化炭素投與後ハ

第11表 四鹽化炭素投與
家兎9號

「アドレナリン」注射後徐々ニ血糖ノ上昇ヲ來シ、
2時間後ニシテ其ノ最高値 258 mg % ニ達シ、次
デ徐々ニ其ノ下降ヲ來ス(第 11 表参照)。

以上實驗成績ヲ小括スルト次ノ様ニナル。即チ
四鹽化炭素投與後肝臟機能障礙ガ惹起セラレタト
思ハルル時期ニ F-S ノ負荷試験ヲ行ツテミルト
尿中 F-S 排泄ノ出現時間ハ正常時ヨリモ著シク
遅シ、且負荷後 3 乃至 5 時間ヲ經過スルモ尿中へ
排泄セラルル F-S 濃度ハ健康時ニ於ケルモノヨ
リモ甚シク淡イ。

尙ホ此成績ヲ前總輸尿管結紮ノ際ニ於ケルモノ
ト比較スルト F-S 尿中出現ノ時間ハ此際前者ヨ
リモ甚シク遅延シ又負荷後 3 乃至 5 時間ヲ經テ認
メラルル F-S 排泄ノ濃度モ亦甚シク淡イ。

「アドレナリン」過血糖程度ハ四鹽化炭素中毒後
ニ於テハ毎常正常時ヨリモ著シク其ノ低下ヲ來シ
且尿中 F-S 排泄ノ障礙ト略ボ軌ヲ一ニスル様デ

アル。

第 4 節 網狀内被細胞系閉塞前後ニ於テ
ル尿中 F-S ノ排泄量ニ「アドレ
ナリン」過血糖ニ就テ

生理的食鹽水ヲ滴下シツツ硝子板上ニテ支那墨
ヲ磨リ墨汁トシ、濾過滅菌後先ヅ 7 cc 耳ヨリ血管
内ヘ注射シ、其ノ翌日及ビ翌々日各々 10 cc 宛注
入シタ。斯ク網内系閉塞ヲ行ツタ其ノ前後ニ於テ
F-S 負荷後ニ於ケル尿中色素排泄ノ状態及ビ「ア
ドレナリン」過血糖ノ變化ヲ見ルト以下ノ様デア
ル。即チ網内系閉塞前ニ於ケル F-S ハ其ノ注入後
20 分ニシテ既ニ尿中ヘ其ノ排泄ヲ見、又 1 時間
30 分乃至 3 時間後ニ於テハ最高點(卅)ニ達ス。
然ルニ網内系閉塞後第 4 日目ノモノ(家兎第 10 號)
ニ就テ見ルニ F-S 投與後尿中殆ド色素ノ排泄ヲ
見ナイ。ソシテ投與後ノ略ボ 6 時間ニ於テ初メテ
少量ノ F-S 排泄ヲ見シノミデアル(第 12 表参照)。

第 12 表 網 内 系 閉 塞

1% F-S, 10 cc. per. Os.

家 兎 番 號		前	20分	40分	1時10分	1時40分	2時10分	3時10分	6時10分	24時
10	前	(-)	(+)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)
	後	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(±)	(±)
11	前	(-)	(-)	(±)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)
	後	(-)	(-)	(-)	(±)	(±)	(±)	(+)	(卅)	(卅)

尙ホ網内系閉塞前ニ於ケル同一家兎ニテ「アドレ
ナリン」注射ニヨル過血糖曲線ノ變化ヲ見ルニ注射
後 1 時間ニシテ血糖ハ其ノ最高値 308 mg % ヲ
示シ以後次第ニ下降シツツ 3 時間後ニ於テ空腹時
血糖値迄歸ル。次ニ網内系閉塞後ニ於ケルモノ
(家兎 10 號)ヲ見ルニ「アドレナリン」注射後血糖
ハ急激ナ上昇ヲ來シ、1 時間後最高値 312 mg %
トナリ、次ニ下降シ、3 時間半後ニ於テ空腹時血
糖値迄下降シタ(第 13 表参照)。尙ホ他ノ家兎
(家兎第 11 號)ニ就テ行ツタ網内系閉塞前後ニ於
ケル F-S 試験ノ成績ハ略ボ前家兎ニ於ケルモノト
同様デアル。即チ網内系閉塞前 F-S ハ 40 分ニシ

第 13 表 網 内 系 閉 塞
家 兎 10 號

テ尿へ其ノ出現ヲ來シ、3—6 時間後 = 於テ其ノ最高値(卅)ヲ示ス。然ルニ網内系閉塞後第 4 日目ノモノデハ F-S 投與後 1 時間 = シテ初メテ尿中へ其ノ排泄ヲ認メ、3 時間乃至 6 時間 = シテ其ノ最高値(卅) = 達スルヲ見タ。

以上得ラレタ實驗成績カラ之ヲ考察スルニ「アドレナリン」過血糖曲線ハ網内系閉塞ニヨツテ其ノ變化ヲ被ラナイ、之ニ反シ尿中へノ F-S 排泄ハ其ノ出現ニ遅延ヲ來スト共ニ尙ホ最高値 = 於ケル色素濃度ノ減少モ認ムルコトガ出來ル。以上實驗成績ヲ小括スルト次ノ様ニナル。即チ墨汁ヲ以テ網内被細胞系ノ閉塞ヲ行ヘル際ハ F-S 負荷後 = 於ケル尿中へノ色素出現時間 = 遅延ヲ來スノミデナク、更ニ 1 乃至 3 時間後ノ尿 = 就テ認メラルベキ F-S 排泄濃度モ亦其ノ減少ヲ來ス。即チ網内系閉塞ハ門脈小分枝カラシテ肝靜脈へノ F-S 移行ヲ阻グルモノト察セラレシ。之ニ反シ「アドレナ

リン」過血糖程度 = ハ格別ノ著變ヲ起サナイ。

第 5 節 Fuchsin-S 經皮の投與 = 就テ

1) 四鹽化炭素中毒家兎ノ場合

1% F-S 5 cc ヲ皮下へ注射シ、注射後 20 分、40 分、1 時 10 分、1 時 40 分、2 時 10 分、3 時 10 分、6 時 10 分及ビ 24 時間後 = 於ケル尿 = 就テ檢メ F-S ノ排泄ヲ見、次デ四鹽化炭素 (pro kg 0.5 cc) 投與後 2 日目ノモノ = 就テ同様ノ實驗ヲ行ヘル結果次ノ成績ヲ得タ。即チ四鹽化炭素投與前 = 於ケル尿中 F-S ノ出現ハ其ノ投與後 20 分 = シテ現レ其ノ最高値ハ 40 分乃至 1 時間ノ間デアリ。

次ニ四鹽化炭素投與後 2 日目ノモノ = 就テ見ルト F-S ノ出現ハ 20 分後デアリガ其ノ排出濃度ハ弱ク、又最高値へ達スル時間ノ延長ガ認メラレシ。即チ 1 時間乃至 3 時間 = シテ最高値ヲ現シテ居ル併シ色素排泄ノ程度ハ弱イ (第 14 表參照)。

即チ上記實驗成績カラ F-S 皮下注射ノ場合 =

第 14 表 四鹽化炭素中毒

1% F-S. 5 cc Subcutan. inj.

家 兎 號		前	20分	40分	1時10分	1時40分	2時10分	3時10分	6時10分	24時
12	四鹽化炭素中毒前	(一)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)
	中 毒 後	(一)	(十)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)
13	四鹽化炭素中毒前	(一)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)
	中 毒 後	(一)	(十)	(十)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)

於テモ亦肝臟機能障礙ノ存在ヲ認識スルコトガ出來ル。

次ニ前實驗ト同様ノ方法ヲ以テ 1% F-S 2 cc ヲ皮下へ注射シ、四鹽化炭素投與ノ前後 = 於ケルノ排泄ヲ比較觀察シタ、四鹽化炭素投與ノ前後 = 於ケル F-S ノ排泄ヲ比較觀察シタ。即チ四鹽化炭素

投與後 3 日目ノモノ (家兎第 14 號) = 就テ見ルト尿中へノ色素出現ハ 20 分デアリ、其ノ濃度ハ四鹽化炭素投與前 = 比シ多少弱イ、併シ一般 = F-S ノ排泄ハ其ノ投與ノ前後 = 於テ著變ヲ示サナイ。即チ上記 F-S 5 cc 投與ノ場合ト全ク同様デアリ。

第 15 表 四鹽化炭素中毒

1% F-S. 2 cc Subcutan. inj.

家 兎 號		前	20分	40分	1時10分	1時40分	2時10分	3時10分	6時10分	24時
14	四鹽化炭素中毒前	(一)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(十)
	中 毒 後	(一)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(十)

2) 網内被系細胞閉塞ノ場合
前同様 F-S 5 cc フ皮下ニ注射シ網内系閉塞前後ニ於ケル尿中 F-S 排泄ノ状態ヲ見ルト、閉塞前ニ於ケル F-S ハ 20 分ニシテ尿中ニ現レ(卅) 1 時間

後既ニ其ノ最高値(卅)ニ達ス。又網内系閉塞後ノモノニ就テ見ルト F-S 負荷後同ジク 20 分ニシテ既ニ色素出現ハ陽性(卅)トナリ、1 時間ニ於テ其ノ最高値(卅)ニ達ス。即チ尿中 F-S 排泄ハ網内系

第 16 表 網 内 系 閉 塞

1% F-S. 5 cc Subcutan. inj.

家兎番號		前	20分	40分	1時10分	1時40分	2時10分	3時10分	6時10分	24時
16	網内系閉塞前	(—)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)
	閉塞後	(—)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)

閉塞ノ前後ニ於テ其ノ著變ヲ示サナイ。

注射シ、網内系閉塞前後ニ於ケル其ノ排泄ヲ追及

次ニ亦同様ノ方法ヲ以テ 1% F-S 2 cc フ皮下ヘ

セルニ之ヲ略ホ前同様ノ成績ヲ得タ(第 17 表参照)

第 17 表 網 内 系 閉 塞

1% F-S. 2 cc Subcutan. inj.

家兎番號		前	20分	40分	1時10分	1時40分	2時10分	3時10分	6時10分	24時
16	網内系閉塞前	(—)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(+)
	閉塞後	(—)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(卅)	(+)

即チ F-S 皮下注射ニ際シテノ成績ハ之ヲ經口ノ投與ノ場合ト比較スルト著シク相違ガアル。即チ網内系閉塞後ニ於テ經口ニ F-S ヲ投與スレバ尿中ニ於ケル當該色素ノ出現ニ甚シキ遲延ヲ來スノミデナク、尙ホ一定時間ヲ經過スルモ、尿中ヘ排泄セラルル濃度ハ著シク淡イ。之ニ反シ皮下ヘ F-S 注射ヲ行フ際ハ色素排出現時ニ遲延ハナク又一定時間後ニ於ケル尿中色素排泄ノ濃度モ亦極メ濃イ。

上記實驗成績ヲ要約スルト次ノ様ニナル。F-S 經口ノ投與ノ際ハ四鹽化炭素中毒ニヨツテ尿中ヘ F-S 出現並ニ其ノ排泄濃度ヘ著變ヲ認メ得ルモ F-S 皮下注射ニ際シテハ四鹽化炭素中毒後ト雖モ F-S 排泄ニ著變ヲ來サナイ。之恐ラクハ F-S 門脈系ヲ經テ直接肝臟ヘ到達セザル爲ト考ヘラル。即チ F-S ニヨル肝臟機能検査法ヘ經口ノ F-S ノ投與ニヨツテノミ其ノ正確ヲ期待シ得ルモノト推斷セラル。

第 4 章 總括並ニ考按

家兎ニ就テ總輸膽管結紮、四鹽化炭素ノ投與及ビ墨汁ヲ以テスル網内系ノ閉塞ニヨツテ肝臟機能障礙ヲ起サシメタ後 F-S 排泄試驗並ニ「アドレナリン」過血糖状態ヲ追及シ得タ成績ヲ總括スレバ次ノ様デアル。

1) 1% F-S 10 cc ノ經口ノ投與ヲ行ヒ、後 20 分、40 分、1 時 10 分、1 時 40 分、2 時 10 分、3 時 10 分、6 時 10 分及ビ 24 時間ニ於ケル夫々ノ尿ニ就テ、F-S ノ排泄ヲ總輸膽管結紮ノ前後ニ於テ比較研究シタ結果ハ次ノ様デアル。即チ總輸膽管結紮後第 2 日目ニ於ケル實驗デハ尿中 F-S ノ排泄ハ結紮前ノモノト比較シ格別ノ變化ヲ示サナイ。然ルニ結紮後 5 日目及ビ 8 日目は於ケルモノニ於テハ尿中 F-S ノ排泄ニ相當ノ障礙ヲ認ムルコトガ出來ル。即チ鬱滯性黄疸ノ進行ニツテ尿中 F-S ノ排泄ハ其ノ出現並ニ濃度ニ於テ明ガニ其ノ障礙ヲ被ルニ至ル。「アドレナリン」注射ニヨル過血糖

曲線ハ總輸膽管結紮後ノ日數ニ應ジテ著明ナル過
血糖程度ノ低下ヲ來ス。

2) 四鹽化炭素 pro kg 0.5 cc ノ割合ヲ以テ家
兎ニ經口ノ投與ヲ爲シ其ノ前後ニ於テ 1% F-S
10cc ヲ負荷シ、尿中 F-S ノ排泄及ビ「アドレナ
リン」過血糖曲線ヲ比較シテ結果次ノ成績ヲ得タ。
即チ四鹽化炭素中毒ニ際シテハ其ノ以前ニ比シ、
F-S 經口ノ投與後尿中ニ排泄セララル色素出現ニ
至ル迄ノ時間ニ遲延ヲ來シ且排泄濃度モ亦其ノ減
少ヲ來ス。然ルニ F-S 皮下注射ノ場合デハ、尿中
ニ於ケル色素排泄障礙ガ前者程明白デハナイ。
「アドレナリン」注射ニヨル過血糖程度ハ四鹽化炭
素投與後ニ於テハ每常過血糖程度ノ明白ナ低下ヲ
來ス。

3) 墨汁ヲ最初 7 cc 次ニ 10 cc 宛 2 回注入シテ
網内系細胞ヲ閉塞シ其ノ前後ニ於テ F-S 試験液
ニ「アドレナリン」過血糖程度ヲ比較シテ成績ヲ
得タ。即チ網内系閉塞後 1% F-S 10 cc 經口ノ投
與ノ場合ニ於テハ每常尿中 F-S 排泄ニ顯著ナル
障礙ヲ認メル。之ニ反シ 1% F-S 5 cc 乃至 2 cc 經
皮ノ投與ノ場合ニ於テハ網内系閉塞ノ前後ニ於テ
何等著變ヲ見ナイ。尙ホ「アドレナリン」0.2 cc 注
入ニヨル過血糖曲線ハ網内系閉塞ニヨリ全ク其ノ
變化ヲ示サナイ。

倍上記實驗成績ヨリ從來ノ文獻ヲ參照シ聊カ考
按ヲ試ミルニ總輸膽管結紮及ビ四鹽化炭素投與ガ
肝臟ニ一定ノ變性ヲ來サシムルコトハ既ニ余ノ
「アセトン」ニヨル肝臟機能検査法ナル論文ニ於テ
述ベタル所デアル。而シテ本實驗ニ於テ總輸膽管
結紮ヲ爲セル 2 頭ノ家兎 (第 5 號家兎並ニ第 6 號
家兎) ニ於テモ亦著明ナル黄疸ト共ニ肝臟ノ輕度
ナル肥大ヲ來シ、且表面並ニ剖面ニ於テハ黄色様
斑點ガ認めラレ膽囊ハ極度ニ擴張セリ。又肝臟ノ
一部ヲ切片ト爲シ之ヲ鏡檢スルニ肝臟ノ實質細胞
ハ一般ニ瀰漫腫脹ヲ來シ小葉間結締織ノ稍々増殖
ト Schaltstück ノ新生及ビ實質細胞ニ於ケル網
狀壞死竈存在ヲ多數ニ認メ得タガ血管ノ新生並ニ

鬱血等ハ之ヲ認メ得ナカツタ。

又四鹽化炭素ノ場合(第 8 號並ニ第 9 號家兎)ニ
就テハ黄疸ノ發生ハ著明デナカツタガ肝臟ハ一般
ニ稍々其ノ萎縮ヲ來シ、之ヲ鏡檢スルニ肝小葉周
邊部ノ肝實質細胞ハ稍々腫大スルモ原形質及ビ核
ニ變化ヲ認メ難ク、小葉中心部及ビ中間帶ニ於テ
ハ核ノ破壞消失セルモノヲ多數ニ見タ。尙ホ網内
被系閉塞ヲ行ヘル 4 例(第 10, 第 11 號家兎, 第 15,
第 16 號家兎)ニ於テハ一般ニ肝臟ハ其ノ黒染ヲ
來スト雖モ形狀及ビ硬度ニ變化ヲ認メ難ク之ヲ鏡
檢スルニ網内被細胞系ハ強ク墨汁ヲ取ツテ黒染セ
ルコトヲ認メ得タ。

倍斯様ノ解剖學的變化ガ肝臟ニ發生ヲ來シタト
スレバ其ノ機能障礙ヲ惹起スルコトハ勿論デアツ
テ其ノ結果又種々ノ新陳代謝異常ヲ伴フコトモ推
察ニ難クナイ。

從來行ハレタ色素排泄試験ハ多クハ靜脈内或ハ
皮下ニ色素ヲ注射シ以テ尿中ニ其ノ排泄或ハ血
中ヨリノ消失乃至十二指腸液ニ其ノ排泄ヲ測定
スルコトニヨツテ機能検査ノ判斷ニ使用シタ。而
シテ非經口ノ投與ニヨル色素ハ其ノ性狀ニ應ジ或
ハ肝臟ヨリ或ハ腎臟ヨリ主トシテ其ノ排泄ヲ來ス
ト言ヘレテ居ル。

岡通氏ニヨルト「コロイド」状態ニアル色素例
ヘバ Kongorot, Kongokorinth-G. Azoblau,
Kon-gorubin A. 及ビ Anilinblau ハ主トシテ肝
臟ヨリノ排泄ヲ來スト言フ。即チカカル性狀ノ色
素類ハ肝臟機能検査法ニ最適ノモノト言フコトガ
出來ル。

倍經口ノ投與ヲ爲セル脂肪類以來ノ異物特ニ毒
物ハ從來ヨリ明カニサレタ様ニ乳糜管又ハ胸管ヲ
通ルコトナクシテ吸收セラル。之明カニ該物質ハ
門脈ヲ經テ直接肝臟ニ到達スルコトヲ示スニ外ナ
シ。即チ門脈系ハコノ際其ノ解毒機轉ニ對シ重
要ナル生理的意義ヲ有スルモノト考ヘラレル。從
ツテ異物乃至毒物ハ門脈系ヲ通過スル間ニ於テ其
ノ變性ヲ被ルコトモ想像ニ難クナイ。斯ク考察ス

レバ經口の投與ニ際シテノ F-S モコレ又異物ト同一ノ經路ヲ通り其ノ吸收及ビ變性ヲ受クルモノト考ヘネバナラン。余ノ行ツタ家兎ニ就テノ實驗成績ヲ見テミルト家兎ヘ肝臟機能障礙ヲ起サシメタ後經口の F-S ノ投與ヲ行フ場合ニ於テハ非經口の投與ノ場合ヨリモ著シク其ノ排泄障礙ヲ認ムルコトガ出來タ。之門脈系統ガ F-S 排泄ニ對シテナル役割ヲ演ジテ居ルコトヲ物語ルニ外ナラン。尙ホ在來ノ研究ニヨルト網内被細胞ガ色素貪喰作用ニ携ルコトハ周知ノ事實デアリ、又網内系閉塞ニ由ツテ其ノ機能脱落ヲ招來セシムルコトモ明白デアリ。而シテ余ノ行ツタ網内系閉塞試驗ノ結果カラ推測スルト網内系閉塞ハ門脈分枝ヘ到達シタ F-S ヲシテ肝靜脈枝ヘノ移行ヲ阻止スル様ニ思ハレル。從ツテ F-S ノ經口の投與ニ際シテハ尿中 F-S ノ移行ヲ認メ難イ、之ニ反シ皮下注射ニ際シテハ網内系閉塞ノ有無ニ關係ナク尿中ヘノ F-S 移行ヲ認ムルコトガ出來ル。

倍岡通氏ハ F-S ハ腎臟ノミヨリ排泄セラレ、肝臟ヲ通過シナイト主張シタサレド 1927 年 Karczag 及ビ Borak ハ F-S ヲ皮下注射セル海狸ニ於テ其ノ膽汁ガ強ク着染セル事實ヲ認メ以テ Borak ハ F-S ハ肝臟ヲ通過スル色素ナルコトヲ主張シタ。余ノ實驗ニ就テ觀テモ網内系閉塞ノ時タルト四鹽化炭素使用ノ場合トフ間ハズ經口の F-S 投與ノ場合ニ於テノミ著明ニ其ノ排泄障礙ヲ來シテ居ル。之ニ反シ經皮的 F-S 投與ニ際ニ於テハ尿中色素排泄ノ障礙ハ遙カ前者ニ及バナイ、コレ肝臟ヲ直接通過スル色素量ノ少キコトヲ示スニ外ナラン。即チ經口の投與ニヨル F-S ハ門脈ヲ經テ肝臟ニ達シ肝實質細胞ニ影響ヲ受ケテ大循環ニ入り腎臟ヲ經テ尿ヘ排泄ヲ來スモノト考ヘラル。而シテ肝臟障礙ニ際シ F-S 排泄ニ障礙ヲ來サシムル所以ハ恐ラクハ健全ナル肝臟ハ色素ガ肝臟ヲ通過スル場合其ノ「コロイド」状態ヲ變化セシメ以テ腎臟ヲ經テ尿中ヘ其ノ排泄ヲ來サシムルモノト考ヘラル。然ルニ肝臟機能障礙時ニ於テハ上記作用ヲ完

全ニ遂行シ得ザル結果 F-S 尿中排泄ニ障礙ヲ招クモノト推察セラル。次ニ「アドレナリン」過血糖ノ發生ト F-S 排泄試驗トヲ比較スルニ總輸膽管結紮ノ場合ニ於テハ「アドレナリン」過血糖低下ノ程度ハ F-S 試驗ニ於ケルモノヨリモ顯著デアリ。之ニ反シ四鹽化炭素中毒及ビ網内系閉塞ヲ行ヘル場合ニ於テハ F-S 排泄障礙ノ方ガ「アドレナリン」過血糖ニヨルモノヨリモ、寧ろ明瞭ナル成績ヲ示ス。要之ニ F-S ヲ以テスル肝臟機能検査法ハ網内被細胞系立ニ肝實質細胞ニ於ケル變化ニ際シ、ヨリヨク其ノ機能障礙ヲ知悉セシム可キモノ尙ホ膽管ノ機械的閉塞ニヨリ高度ナル胆汁鬱積ノアル場合ニ於テモ亦其ノ機能検査法トシテ之ヲ實用スルニ足ル方法ト考ヘラル。加之、コノ方法タルヤ其ノ操作極メテ簡單且鋭敏ナルガ故ニ臨牀上ニ於ケル最適ノ方法ト思惟セラル。

第5章 結 論

上記成績ノ結果ヲ結論セバ次ノ如シ。

- 1) 總輸膽管結紮ニヨル器械的黃疸ガ尙ホ輕度ナル場合ニ於テハ尿中 F-S ノ排泄ニ異常ヲ認メナイガ黃疸ノ進行ニツレテ尿中 F-S 出現ノ遲延ト色素最高濃度ノ低下トヲ來ス。
- 2) 「アドレナリン」過血糖ハ總輸膽管結紮後ノ晚期デハ勿論早期ニ於テモ亦著變ヲ示ス。
- 3) 四鹽化炭素中毒ニ際シテノ肝臟機能障礙ハ經口的 F-S 投與後ニ於ケル尿中 F-S 出現ノ遲延ト色素最高濃度ノ低下カラ之ヲ推斷スルコトガ出來ル。但シ F-S 皮下注射ハ肝臟機能障礙ヲ推知スルニ足ル様ナ尿所見ヲ與ヘナイ。
- 4) 四鹽化炭素中毒ニ際シテノ「アドレナリン」過血糖曲線ノ變化ハ略ボ F-S 經口の投與後ニ於テ認メラル F-S 排泄ノ障礙ト略ボ相一致シテ居ル。
- 5) 網内系閉塞後ニ於テ F-S 經口の負荷ヲ行フ際ハ尿中 F-S ノ發現ハ甚シク遅レ且 3—6 時間ヲ經過スルモ尿中色素排泄ハ著シク少イ。之ニ反シ F-S 皮下注射ハ尿中色素排泄ニ變化ヲ來ザナイ。

6) 網内系閉塞 = ヲツテ F-S ノ排泄ハ顯著ナル障碍ヲ被ル = 拘ラズ「アドレナリン」過血糖曲線ハ格別ノ變化ヲ認メナイ。

7) F-S = ヲル肝臟機能検査法ハ其ノ經口的投與 = ヲツテノミ可能デアツテ皮下注射ハ推知スル = 足ル尿所見ヲ齎サナイ。

8) 肝臟機能検査法トシテノ F-S 試験ハ肝臟

實質細胞變性ノ場合ハ勿論尙ホ鬱滯性黄疸ノ場合 = 於テモ亦用ヒラレルノミデナク網内系機能脱落ノ判定 = 際シテモ亦之ヲ適用スルコトガ出來ル。

摺筆スル = 當リ恩師稻田教授ノ御懇篤ナル御指導並ニ御校閱 = 對シ滿腔ノ謝意ヲ表ス。

文 獻

- 1) *Bilazemplén*, Zeitschrift für Klin. Med. Bd. 138, 1940. 2) *Borak*, Med. Klinik, Nr. 51, 1927. 3) 岡通, Tohoku Journal of Experimental Medizin 64, 1926. 4) *Eppinger*, Die Leber Krankheiten, Wien Julius Springer 1937. 5) *Schmiegl*, Bergmann-Stabelius Handbuch d. Inneren Medizin Bd. 3, S. 1190, Berlin Julius Springer 1938. 6) *Zemplén*, Z. Klin. Med. 133, 588, 1938. 7) *Wien*, Arch. inn. Med. 34. 243, 1940. 8) 生山, 日本消化器病學會雜誌, 第34卷, 第3號. 9) 古賀, 滿洲醫學會雜誌, 第33卷, 第2號, 252. 10) *Simmond*, Dtsch. Arch. f. Klin. Med. Bd. 27. 11) *Bauer*, Dtsch. Arch. f. Klin. Med. Bd. 31. 12) *Inchmer*, Virchow's Arch. Bd. 175, 1905. 13) 碑田, 南滿醫學會雜誌, 第12卷. 14) 飯島, 東京醫學會雜誌, 昭和5年.

Aus der Inneren Inada-Klinik der Med. Fakultät Okayama.

(Direktor: Prof. Dr. S. Inada)

Die Leberfunktionsprüfung mit der Fuchsin-S Belastung.

(1. Mitteilung)

Von

Dr. Yasumasa Ueda.

Eingegangen am 10. Dezember 1942.

Die Untersuchung des Farbstoffausscheidungsvermögens, die sog. Chromodiagnostik, wurde 1912 von Koch in die Reihe der klinischen Laboratoriumsmethoden eingeführt, der die Ausscheidung von Methylenblau beobachtete. Seither wurde eine ganze Reihe von Farbstoffen empfohlen (Tetrachrolphenolphthalein, Kongorot, Azorubin-S, Indigokarmin usw.) die durch die Leber ausgeschieden werden.

1927 hat Borak die Beobachtung der Ausscheidung des Fuchsin-S als einfache, ohne besondere Ausrüstung ausführbare Probe empfohlen. Borak gibt keine Erklärung für das Ausbleiben der Fuchsin-S-Ausscheidung bei schweren Leberschädigung.

Seine Feststellung sind nur empirisch. Daher überprüfte Verfasser diese Methode.

Er gab Kaninchen auf nüchternen Magen 10 cc 1%iges Fuchsin-S und darauf ein Glas Wasser zu trinken.

Der Harn wurde $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, $1\frac{1}{6}$, $1\frac{2}{3}$, $2\frac{1}{6}$, $3\frac{1}{6}$, $6\frac{1}{6}$ und 24 Stunden nach der Einnahme des Farbstoffes gesammelt und nach Ansäuerung mit Essigsäure der Beginn der Ausscheidung und die Farbintensität bestimmt.

Verfasser verglich die Farbintensität des Fuchsin-S im Harn vor und nach der Leberschädigung mit Carbonatetrachlorid, Choledochusunterbindung, und Blockierung der Leberendothelzellen.

Dabei ergaben sich folgende Resultate.

1) Wenn der mechanische Ikterus nach der Choledochusunterbindung noch leicht ist, wird die Ausscheidung des Fuchsin-S zum Harn nicht gestört. Mit der Zunahme des Ikterus wird der Beginn die Ausscheidung verzögert und auch die Farbintensität vermindert.

2) Die Hyperglykämie nach subkutaner Adrenalin-Zufuhr (0.1% Adrenalin, 0.2 cc) vermindert sich natürlich im späteren Stadium der Choledochusunterbindung wie auch im früheren Stadium,

3) Wenn das Kaninchen mit Carbontetrachlorid vergiftet wird, kann man den Leberschädigungsgrad durch den Verminderungsgrad der Fuchsin-S-Ausscheidung zum Harn beurteilen.

Aber wurden keine Leberfunktionstörungszeichen beobachtet, wenn das Fuchsin-S subkutan injiziert wird.

4) Die Verminderung der Hyperglykämie nach der Adrenalin-Injektion verläuft fast parallel mit der Ausscheidungsstörung des Fuchsin-S zum Harn nach paroraler Zufuhr des Farbstoffes.

5) Wenn man dem Kaninchen das Fuchsin-S (paroral) nach Blockierung der Leberendothelzellen gibt, dann wird die Ausscheidung des Fuchsin-S zum Harn sehr vermindert. Wenn das Fuchsin-S aber subkutan injiziert wird, wird die Fuchsin-S-Ausscheidung zum Harn nicht vermindert.

6) Die Hyperglykämie vermindert sich nach der Adrenalin-Injektion durch Blockierung der Leberendothelzellen nicht.

7) Die Leberfunktionsprüfung mit Fuchsin-S ist nur durchführbar, wenn man das Fuchsin-S paroral gibt.

8) Man kann die Leberfunktionsprobe mit Fuchsin-S anwenden, wenn Leberparenchymzellen gestört sind und ein alter Choledochusschluss und Blockierung der Leberendothelzellen besteht. (Autoreferat)