

◎ 浮田氏論文正誤表

第 1 報 (47年第6號)

頁	誤	正
1550	滅(右下ヨリ2行目)	滅
1552	烏(左上ヨリ12行目)	魚
1554	赤血球球(右下ヨリ17行目)	赤血球
1555	貧血性家兔(右下ヨリ11行目)	貧血家兔
1557	藥局法(左下ヨリ15行目)但2箇所	藥局方
◇	1% Kresylblaua- (右下ヨリ2行目)	1% Brillantkresyiblaual-
1574	↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓(第4圖(1)「ヘパトーゼ」投與	↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
1580	◇ (第6圖(3)鐵「エ」及ビ硫酸銅注射)	◇
1582	◇ (第7圖(1)及ビ(2)還元鐵投與)	◇
1584	驗實(右上ヨリ18行目)	實驗
1591	赤血球數減ハ(右上ヨリ7行目)	赤血球數減少ハ
1612	増田(左下端)	増原

第 2 報 (47年第7號)

頁	誤	正
1775	血色素量ト(左下ヨリ16行目)	血色素量
1777	Willam(右上ヨリ8行目)	William
◇	Adersbergu. (右上ヨリ18行目)	Adersberg u.
1780	平均價(第1表(1)及ビ(2))	平均值
◇	85.0?(第1表)(1)24時間. 上ヨリ2行目)	35.0?
1782	健常家兔ハ(左下ヨリ3行目)	健常家兔ニ於テハ
1793	159(第5表)(3)赤血球數. 上ヨリ4行目)	559
1796	539(第6表)(2)赤血球數. 上ヨリ3行目)	439
◇	1.50(同上. 色彩指數. 上ヨリ1行目)	1.56
◇	28.0!(同上. 24時間. 下ヨリ3行目)	28.0
1800	緩浸(右下ヨリ2行目)	緩漫
1807	24.2(第9圖(2)網狀赤血球. 第3日)	14.2
1815	適當刺戟ナル(右下ヨリ6行目)	適當刺戟量ナル
1831	主唱者トシテ(右上ヨリ9行目)	主唱者ニシテ
1834	Naun-Schmiedbergers(右下ヨリ18行目)	Naunyn-Schmiedbergers
◇	1932(右下ヨリ15行目)	1923